


Маример®

гіпертонічний

 Laboratoires Gilbert
928, Avenue du General de Gaulle
14200 Herouville Saint-Clair, FRANCE

Найменування та місцезнаходження
уповноваженого представника в Україні:
ТОВ «Фарма Старт»
Україна, 03124, м. Київ, бул. І. Ленсе, 6. 8

Інструкція із застосування

Спрей назальний гіпертонічний МАРИМЕР® - натуральний продукт, який є стерильним гіпертонічним розчином морської води з мікродифузною системою впорскування. Від природи збагачений мінеральними солями та морськими мікроелементами, спрей назальний гіпертонічний МАРИМЕР® рекомендовано для дітей та дорослих для очищення та розблокування закладених носових ходів, у тому числі при застуді, синуситі та післяопераційному догляді.

Мікродифузна система впорскування **МАРИМЕР®** та механічний ефект гіпертонічного водного розчину полегшують промивання носових ходів. Процедура очищення носа захищає слизові оболонки від зовнішніх загроз та забезпечує нормальне дихання носом.

СКЛАД

100 % стерильний гіпертонічний розчин морської води, що еквівалентно солі 22 г/л.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Спрей назальний гіпертонічний МАРИМЕР® рекомендується:

- для очищення носових ходів,

- для розблокування закладеного носа,
- як додаткова складова при захворюваннях ЛОР-органів.

ДОЗУВАННЯ

По 1-2 впорскування у кожен носовий хід, 1-3 рази на добу, за потребою.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Нахиліть голову вбік.
- Вставте насадку у ніздрю та вприсніть спрей назальний гіпертонічний **МАРИМЕР®** у верхній носовий хід.
- Повторіть процедуру з іншим носовим ходом.
- Поверніть голову у вихідне положення, щоб дати носовим виділенням витекти, потім видаліть залишки розчину серветкою або звільніть ніс від носових виділень.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Дозуючий пристрій слід очищати мильним водним розчином після кожного застосування. Промити та витерти.

НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ НАСЛІДКИ

На початку застосування можливе відчуття поколювання або подразнення, що минає.

Спрей назальний гіпертонічний МАРИМЕР®

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати недоношеним дітям. Особам, які страждають на захворювання, що ускладнюють дихання (наприклад, астма), слід проконсультуватися з лікарем. Не можна використовувати особам із підвищеною чутливістю до морської води.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Застереження. Флакон під тиском: може лопнути при нагріванні. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор, відкритого полум'я, гарячих поверхонь та будь-яких інших джерел запалювання. Курити заборонено в безпосередньої близькості з флаконом. Не проколювати та не спалювати навіть після використання. Захищати від сонячних променів. Зберігати при температурі не вище 50°C.

Зберігати поза полем зору та в недоступному для дітей місці.

Не використовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі.



Уважно прочитайте інструкцію із застосування



Виробник



Партія



Дата виготовлення



Дата закінчення терміну придатності



50°C
Зберігати при температурі не вище 50°C



Стерильно



UA.TR.039



Laboratoires
GILBERT